紫瑞宁®

核准日期：2007年05月09日
修改日期：2026年02月28日

坤净栓说明书

Kunjing Shuan

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
本品含呋喃唑酮，对葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者慎用
孕妇及哺乳期妇女禁用

【药品名称】
通用名称：坤净栓
汉语拼音：Kunjing Shuan
【成　　分】本品每粒含呋喃唑酮50mg
【性　　状】本品为黄褐色至褐色鱼雷形栓剂，
【功能主治】
【规　　格】每粒重3g（含呋喃唑酮50mg）
【用法用量】阴道给药，一次1粒，一日1次，连用7天为一个疗程，
下贮藏，如温度过高致栓粒变软、变形时，应在使用前
续使用，不影响疗效。
【不良反应】
【禁　　忌】1、对本药和其它硝基呋喃类药过敏者禁用。
2、孕妇及哺乳期妇女禁用。
【注意事项】本品为中西复方制剂，鉴于尚无充分的临床研究数据证实本复方制剂
减轻或
在此罗列口服所含化学药物呋喃唑酮的相关内容，以提示医生和患者在使
用本品时予以关注。
1、一般不宜用于溃疡病或
2、口服呋喃唑酮期间
发热、头痛、恶心、腹痛、心动过速、血压升高、胸闷、
停药后3天内，禁止饮酒。
3、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6PD）缺乏者可致溶血
4、本品含有呋喃唑酮，以下为单独使用该化学药物时的不良反应，主要有恶
心、呕吐、腹泻、头痛、头晕、药物热、皮疹、肌肉痛、关节痛、呼吸困难、直立性低
血压、粒细胞减少等，偶可出现溶血性贫血、黄疸及多发性神经炎。
5、本品含呋喃唑酮，以下均为该化学药物与其它药物同用时的相互作用：
(1)与三环类抗抑郁药合用可引起急性中毒性精神病，应予避免。
(2)本品可增强左旋多巴的作用。
(3)拟交感胺、酪胺食物、食欲抑制药、单胺氧化酶抑制剂等可增强本品作用。
【贮　　藏】密封，置阴凉（不超过20℃）干燥处。
【包　　装】聚氯乙烯/低密度聚乙烯共挤膜药用复合硬片，4粒/盒（每片4粒/盒）
【有 效 期】
【执行标准】
【批准文号】国药准字Z20050904
【药品生产企业】
名　　称：亚宝药业四川制药有限公司
注册地址：四川省彭州工业开发区柏江北路368号
【生产企业】
企业名称：亚宝药业四川制药有限公司
生产地址：四川省彭州工业开发区柏江北路368号
邮政编码：611930
电话号码：028-83753087（质量）83752193（销售）
传真号码：028-83753077
注册地址：四川省彭州工业开发区柏江北路368号
网　　址：http://sczy.yabao.com.cn